

Inferencia Estadística

Inferencia sobre dos poblaciones

Edimer David Jaramillo - Bioestadística 1

Marzo de 2019

Inferencia sobre $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$

Prueba de hipótesis para $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$

- 1 Definir la hipótesis nula y alternativa
- 2 Calcular el estadístico

$$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}}$$

- 3 Definir el error tipo I α
- 4 Calcular el valor P en una distribución *t - student* con $n - 1$ grados de libertad
- 5 Comparar el valor P con α y concluir.

IC para $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$

Si \hat{p}_1 y \hat{p}_2 son las proporciones de éxito de dos muestras aleatorias independientes de tamaño n_1 y n_2 , entonces un intervalo del $(1 - \alpha)100\%$ para $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ está dado por la siguiente expresión:

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}{n_2}}$$

Ejemplo $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$